

日付	曜日	経過日数	週	経過日数	事象	時期	基本状態	注意点	備考
		0			交尾	妊娠前期			
		1	1w						
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
		7							
		8	2w						
		9							
		10					つわり		
		11							
		12							
		13							
		14							
		15	3w				・子宮ヘルニアに注意 ・おりものに悪臭、赤黒い場合は「子宮捻転」の可能性あり		
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21				妊娠中期			
		22	4w						
		23							
		24							
		25							
		26							
		27							
		28							
		29	5w				5週目乳腺張り		
		30							
		31							
		32							
		33							
		34							
		35							
		36	6w				お腹のふくらみ		
		37							
		38							
		39							
		40							
		41							
		42						出産前後3週間他の犬から隔離	
		43	7w						
		44							
		45							
		46							
		47							
		48							
		49							
		50	8w		妊娠後期	・体温測定 ・胎動を感じる			
		51							
		52							
		53							
		54							
		55							
		56						早産赤ちゃんの適切な処置	* 出産数日前、外陰部が柔らかくなる
		57	9w					* 陣痛は母犬のお腹が波打ち動く	
		58					出産の可能性期間	* 強い陣痛から2時間以内に第1子生まれる	
		59					体温が1℃以上下がると(37.5度)	* 出産の都度、胎盤排出	
		60				食欲不振/出産可能	24時間以内の出産		出産後、2~4分羊膜を破らなければ、補助する
		61							
		62							
		63				出産予定日			へその緒お腹から2cm木綿で縛り切る
		64							
		65				帝王切開の可能性	65日以降は遅産(難産の可能性)	* 陰部から子犬の身体の一部がひっかかっている * 陰部から羊膜が出るのに2時間以上分娩がない	
								* 産後、発熱、無気力、食欲不振 臭いの強いおりもの 子宮筋膜炎に注意	
								* 20~30分陣痛が起きても分娩が起きない * 最初の子犬が産まれて4時間以上経過しても2匹目以降が生まれない * 分娩前から緑色のおりものを排出している	